

"Los síntomas de mi CMH obstructiva

me dejaron sintiéndome como si estuviera fuera del juego, solo observando. Pero ahora he pasado de estar en la banca a estar jugando nuevamente".

ESTE ES

MI MOMENTO[®] CAMZYOS

Stephanie, una paciente real de CAMZYOS

Los resultados individuales podrían variar.

Todas las personas representadas son pacientes reales y sus cuidadores, quienes fueron compensados por su tiempo.

Indicación e Información de seguridad importante seleccionada ¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

✓ adultos con <u>cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática</u> (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS.

Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de imágenes, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas
- dolor en el pecho taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

Presentación de CAMZYOS

Si tiene CMH obstructiva sintomática, es posible que le sea útil la información sobre una opción de tratamiento diferente llamada CAMZYOS en las páginas a continuación.

¿Qué es la CMH obstructiva sintomática?	4-
Cómo actúa CAMZYOS	6-
Resultados de un estudio clínico con CAMZYOS	9–1
Monitoreo, medidas de seguridad y precauciones con CAMZYOS	. 14–
Conozca a pacientes que reciben CAMZYOS	. 17–
nformación de seguridad importante, incluyendo el recuadro de ADVERTENCIA	. 20–2
Efectos secundarios	2
Programa de apoyo a pacientes MyCAMZYOS	

Datos importantes sobre CAMZYOS

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:



adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad.

Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

¿Qué debería hablar con mi proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar CAMZYOS?



Hable con su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si: Está embarazada o planea quedar embarazada. CAMZYOS podría afectar al bebé en gestación



Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que está embarazada durante el tratamiento con CAMZYOS. También puede reportar su embarazo a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072 o visitando www.bms.com.







¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite <u>www.CAMZYOSREMS.com</u> o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluvendo nsuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluvendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.




Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

¿Qué es la CMH?

La CMH obstructiva es el tipo más común de CMH, una afección que puede afectar al funcionamiento de su corazón.

La CMH es una enfermedad cardíaca que puede ser hereditaria, lo que significa que corre en su familia debido a la genética. Se calcula que la CMH afecta a entre una de cada 200* y una de cada 500† personas.

La CMH provoca que la pared del miocardio se engrose y endurezca, haciendo que sea más difícil que el corazón se llene de sangre. Cuando la CMH provoca que el miocardio se ponga tan grueso que bloquea o reduce el flujo de sangre del corazón al resto del cuerpo, se llama CMH obstructiva.



La mayoría de las personas con CMH han sido diagnosticadas con CMH obstructiva.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los **recuadros de ADVERTENCIA**, la <u>Información de prescripción completa para Estados Unidos</u> y la <u>Guía del medicamento</u> de CAMZYOS.

Más información en camzyos.com

¿Cuáles son los síntomas de la CMH obstructiva?

La CMH obstructiva dificulta la relajación del miocardio, por lo que su corazón trabaja con más esfuerzo y usa más energía.

Los síntomas frecuentes pueden incluir:



Hable hoy con su médico si le han diagnosticado CMH obstructiva y presenta cualquiera de los síntomas anteriores.

5

^{*}La publicación Semsarian 2015 identificó que la prevalencia de los portadores del gen de la CMH podría ser tan alta como hasta una de cada 200 personas.

[†]El estudio CARDIA de 1995, un estudio ecocardiográfico multicéntrico, basado en la población de Estados Unidos, realizado con 4111 sujetos (de edades comprendidas entre 23 y 35 años), identificó la prevalencia de la CMH como una de cada 500 personas en la población general.

¿Qué es CAMZYOS?

Si tiene CMH obstructiva sintomática, hable con su médico sobre CAMZYOS, una opción de tratamiento diferente que puede ser adecuada para usted.

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar a adultos con CMH obstructiva sintomática y podría mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad.



CAMZYOS es una cápsula que se debe tomar a la misma hora una vez al día.

Puede tomarse con o sin alimentos. Tome CAMZYOS exactamente de la forma que le indique su proveedor de atención médica. Vea más detalles en la Guía del medicamento.

- No cambie su dosis de CAMZYOS sin consultarlo primero con su médico
- Trague la cápsula entera sin romperla, abrirla ni masticarla
- Si se salta una dosis de CAMZYOS, tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis al día siguiente a su hora habitual. No tome 2 dosis el mismo día para compensar la dosis omitida
- Su médico puede cambiar, suspender temporal o permanentemente su tratamiento con CAMZYOS si presenta determinados efectos secundarios
- Si toma una cantidad excesiva de CAMZYOS, llame a su médico o diríjase de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano

la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.

Más información en camzyos.com

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA.

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite <u>www.CAMZYOSREMS.com</u> o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos

- o si sus síntomas empeoran, incluyendo: • falta de aliento • fatiga • hinchazón de las piernas • dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.




Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

¿Por qué CAMZYOS actúa distinto?


CAMZYOS es el primer y único inhibidor de la miosina cardíaca aprobado por la FDA. CAMZYOS actúa sobre la raíz de la CMH obstructiva sintomática.

Corazón normal




Dos proteínas del músculo cardíaco, llamadas miosina y actina, contribuyen a que su corazón bombee al conectarse (lo que hace que se contraiga el corazón) y soltarse (lo que permite que el corazón se relaje).

Corazón con CMH obstructiva



En la CMH obstructiva, la miosina y la actina forman demasiadas conexiones entre sí, lo que hace que el corazón se contraiga demasiado, lo que puede dificultar que se relaje.

Cómo actúa CAMZYOS en un corazón con CMH obstructiva



CAMZYOS se une a la miosina para que "suelte" a la actina. lo que reduce las conexiones excesivas entre ellas. Esta acción permite que su músculo cardíaco se relaje más.

Miosina conectada



Miosina en reposo



Actina



Unión de **CAMZYOS** a la miosina

En las personas con CMH obstructiva sintomática, la reducción de las conexiones entre la miosina y la actina puede reducir la obstrucción y mejorar la función cardíaca (la forma en que el corazón se relaja y se llena de sangre).

Para ver CAMZYOS en acción, visite camzyos.com/about

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.



Más información en camzyos.com

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte. Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo

está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.


Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:





Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.

Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.



¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo nsuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Cuando se comparó con el placebo

¿Cómo se mostró que CAMZYOS ayudó en dos estudios clínicos?

En el primer estudio, CAMZYOS mejoró los síntomas* y la capacidad para mantenerse en actividad.[†]

Un estudio clínico de 30 semanas de duración realizado en 251 **personas** comparó dos grupos de adultos con CMH obstructiva sintomática. Un grupo (123 personas) tomó CAMZYOS mientras el otro grupo (128 personas) tomó un placebo. Todos los participantes que se inscribieron en el estudio presentaban síntomas (el 73 % tenía síntomas de Clase II y el 27 % tenía síntomas de Clase III según la NYHA*). Aunque no era un requisito, la mayoría de los participantes (231) continuó con su medicamento anterior, un betabloqueador o un bloqueador del canal de calcio.

*Los síntomas se midieron usando la clasificación de la Asociación Cardíaca de Nueva York. (New York

[†]La capacidad para mantenerse activo se determinó midiendo el consumo máximo de oxígeno, o pVO₃, que es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo usa durante el ejercicio. Esto se midió durante una prueba de esfuerzo en una bicicleta o cinta andadora.

*Alguna mejora = mejoró el valor de pVO₂ en al menos 1.5 ml/kg/min. **Mayor mejora** = mejoró el valor de pVO_o en al menos 3.0 ml/kg/min.

El estudio primero analizó cuántas personas presentaron cualquiera de las siguientes:



Alguna mejora[‡] en su capacidad para mantenerse en actividad y una mejora en sus síntomas

Mayor mejora[‡] en su capacidad para mantenerse activo y ningún empeoramiento de sus síntomas

Los resultados demostraron que **hubo más personas que tomaban CAMZYOS** que lograron este resultado (37 %, 45 de 123) en comparación con las que tomaron un placebo (17 %, 22 de 128).



Placebo: una pastilla que no tiene ningún medicamento.

Clasificación según la NYHA: un método que los médicos usan para asignar a las personas a una de cuatro categorías, según sus síntomas de insuficiencia cardíaca. Clase I: ningún síntoma o limitaciones con el ejercicio. Clase II: síntomas leves, algunas limitaciones con el ejercicio. Clase III: síntomas evidentes con una actividad física mínima; comodidad solamente en reposo. Clase IV: síntomas graves en reposo.

CAMZYOS no funciona para todas las personas. Los resultados individuales podrían variar.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.



Más información en camzyos.com

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.


Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:





Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.

Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.




CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



- **Obtenga ayuda médica de inmediato** si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
 - falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
 - taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Cuando se comparó con el placebo en el primer estudio clínico, CAMZYOS*:

Redujo la obstrucción

Al comienzo y al final del estudio, se midió la obstrucción en el corazón de las personas mediante un ecocardiograma después de que hicieran ejercicio. Esto se realizó para determinar cuánta sangre era capaz de bombear el corazón, en milímetros de mercurio o mm de Hg. Los médicos llaman a esta medición el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o TSVI. Un gradiente del TSVI más bajo significa que hay menos obstrucción en el corazón.



La obstrucción del flujo de sangre en el corazón disminuyó 4 veces más con CAMZYOS en comparación con el placebo.

Las personas que tomaron CAMZYOS tuvieron una disminución promedio en su gradiente del TSVI de 47 mm de Hg (comenzó en 86 mm de Hg y bajó hasta 38 mm de Hg), y las personas que recibieron placebo consiguieron una disminución promedio de 10 mm de Hg (comenzó en 84 mm de Hg y bajó hasta 73 mm de Hg).





Gradiente del TSVI: Cuando el corazón se contrae, la sangre oxigenada va desde el corazón hacia el resto del cuerpo mediante una vía llamada el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o TSVI. El gradiente del TSVI es una medición de la presión de sangre a través de esta vía. Un gradiente del TSVI más bajo significa que puede fluir más sangre desde el corazón.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.

Más información en camzyos.com

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo bombear con suficiente fuerza).



insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede

- Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Mejora de los síntomas

La mejora de los síntomas se definió como una bajada de la clasificación según la NYHA al final del estudio.



Aproximadamente 2 de cada 3 personas que tomó CAMZYOS presentó mejora de los síntomas.

De los que tomaron CAMZYOS, el 65 % (80 de 123) mejoró en una o más clases según la NYHA en comparación con el 31 % (40 de 128) de los que recibieron placebo.

Clasificación según la NYHA	Síntomas
Clase I	Ningún síntoma o limitaciones con el ejercicio
Clase II	Síntomas leves, algunas limitaciones con el ejercicio
Clase III	Síntomas evidentes con una actividad física mínima; comodidad solamente en reposo
Clase IV	Síntomas graves en reposo

^{*}Este diferencial cubre los criterios secundarios de valoración

Mejora de la calidad de vida, tal como informaron los pacientes

La cantidad de personas a las que les molestaron los síntomas y presentaron limitaciones físicas se evaluó utilizando el Cuestionario de Cardiomiopatía de la Ciudad de Kansas (versión de 23 preguntas)- Puntuación Resumen Clínico (KCCQ-CSS). Las puntuaciones más altas representan un meior estado de salud.



Mejora tres veces mayor de la carga de los síntomas y en las limitaciones físicas

Desde cuando comenzó el estudio hasta cuando terminó, las personas que tomaron CAMZYOS reportaron un cambio promedio en la puntuación de +14 y los que tomaron placebo reportaron un cambio promedio en la puntuación de +4. La puntuación inicial promedio fue de 71 para los pacientes que iniciaron el ensayo clínico.

La frecuencia y la intensidad de la falta de aliento de las personas se evaluó utilizando el Cuestionario de síntomas de cardiomiopatía hipertrófica: subpuntuación de falta de aliento (HCMSQ-SoB). Puntuaciones más bajas representan menos falta de aliento.



Mejora tres veces mayor en la falta de aliento

Desde cuando comenzó el estudio hasta cuando terminó, las personas que tomaron CAMZYOS reportaron un cambio promedio en la puntuación de +3 y los que tomaron placebo reportaron un cambio promedio en la puntuación de -1. La puntuación inicial promedio fue de 5 para los pacientes que iniciaron el ensayo clínico.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.



Más información en camzyos.com

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).




Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.



¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo nsuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

En el segundo estudio,

CAMZYOS redujo la cantidad de pacientes que eran elegibles para una cirugía o que optaron por someterse a una a las 16 semanas (evitando la cirugía)

Un estudio clínico de 16 semanas de duración realizado en **112 personas** comparó dos grupos de adultos con CMH obstructiva sintomática. Un grupo (56 personas) tomó CAMZYOS mientras el otro grupo (56 personas) tomó un placebo. Cuando empezó el estudio, todos tenían síntomas. Algunos (7 %) tenían síntomas moderados (Clase II de la NYHA), pero la mayoría (93 %) tenía síntomas severos (Clase III o IV de la NYHA). La CMH obstructiva de todos los pacientes estaba tan avanzada que eran elegibles para una cirugía de corazón.

El estudio observó cuántas personas:

Siguieron siendo elegibles para la cirugía en la semana 16

Decidieron proceder con la cirugía antes o durante la semana 16

Los resultados mostraron que CAMZYOS redujo la proporción de pacientes que eran elegibles para la cirugía o que eligieron someterse a la cirugía. El 18 % de las personas que recibieron CAMZYOS (aproximadamente una de cada cinco) y el 77 % de las personas que recibieron placebo (aproximadamente cuatro de cada cinco) siguió siendo elegible para la cirugía en la semana 16 o eligió someterse a la cirugía antes o en la semana 16. Dos personas de cada grupo decidieron someterse a la cirugía.



Cuatro de cada cinco personas que recibieron CAMZYOS experimentaron mejoras en su CMH obstructiva sintomática al punto que fueron capaces de evitar la cirugía* a las 16 semanas

en comparación con una de cada cinco personas que recibieron el placebo

*Ya no eran elegibles y no eligieron someterse a la cirugía en la semana 16.

La mayoría de las personas en este estudio (95 %) también estaban recibiendo tratamientos adicionales para su CMH como un betabloqueador, un bloqueador del canal de calcio, disopiramida o una combinación de estos.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.



Más información en camzyos.com

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).




Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Programa REMS (Estrategia de mitigación y evaluación de riesgos) de CAMZYOS

Su médico le explicará cómo participar en el programa REMS.

En algunos pacientes, CAMZYOS puede provocar la relajación excesiva del corazón, lo que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Debido a este riesgo, CAMZYOS está disponible únicamente a través del programa REMS de CAMZYOS, que es una exigencia de la FDA para monitorear el uso seguro del medicamento.



Hable con su médico sobre cómo inscribirse en el programa REMS de CAMZYOS.

Para poder tomar CAMZYOS, deberá registrarse en el programa REMS de CAMZYOS. El programa requiere que usted:

- Lea y analice con su médico el Folleto del programa REMS para el paciente para entender los riesgos de CAMZYOS y los síntomas de la insuficiencia cardíaca, incluyendo cuándo buscar atención médica
- Informe a su médico sobre todos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre que usted toma, incluidas las vitaminas y los suplementos a base de hierbas, y alerte a su médico y a su farmacéutico sobre cualquier cambio en sus medicamentos durante el tratamiento. No suspenda ni cambie la dosis de un medicamento ni empiece a tomar un medicamento nuevo sin decírselo a su médico
- Se haga un **ecocardiograma** para ver si es elegible para recibir tratamiento con CAMZYOS (obtenga más información sobre los ecocardiogramas en la página 13)
- Complete el Formulario de inscripción de pacientes con su médico
- Se haga **ecocardiogramas de seguimiento periódicamente** en los momentos recomendados por su médico durante el tratamiento con CAMZYOS

Si tiene preguntas sobre el programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su médico.

Visite CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

Para recetar y dispensar CAMZYOS, es necesario que su médico y su farmacia participen en el programa educacional REMS de CAMZYOS, y estén certificados en los riesgos de usar CAMZYOS y en los requisitos para usarlo. Debido a los requisitos especiales del programa REMS de CAMZYOS, este medicamento se dispensa únicamente a través de farmacias especializadas certificadas por el programa REMS y no está disponible a través de farmacias minoristas locales. Su médico le dará información sobre cómo conseguir CAMZYOS en una farmacia especializada. Una farmacia especializada enviará CAMZYOS directamente a su hogar y continuará llamándole para coordinar los envíos del medicamento y ayudar con cualquier problema que pueda surgir con el medicamento.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.

Más información en camzyos.com

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).




Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Monitoreo con CAMZYOS

Los ecocardiogramas periódicos ayudarán a su médico a evaluar cómo afecta CAMZYOS a su corazón y a monitorear su seguridad.

Antes de empezar con CAMZYOS, le harán un ecocardiograma para confirmar si CAMZYOS es adecuado o no para usted. Un ecocardiograma (también conocido como un "eco") es una prueba radiológica, un tipo de estudio por ultrasonido, que se puede usar para examinar el corazón y ver cómo está funcionando.



Si inicia tratamiento con CAMZYOS, debe programar y acudir para que le hagan ecocardiogramas tal como le haya indicado su cardiólogo.

Estas pruebas permiten que el médico vea cómo está respondiendo su corazón al tratamiento y monitorearlo para su seguridad. Según los resultados del ecocardiograma, su médico podría aumentar, disminuir o mantener igual la dosis, o podría suspender su tratamiento en forma temporal o definitiva. Vea a continuación el programa de ecocardiogramas:



de comenzar el tratamiento

de haber comenzado el tratamiento

de haber comenzado el tratamiento

A las 12 semanas de haber comenzado el tratamiento

cada 12 semanas

Su médico le dirá si se requieren más ecocardiogramas después de algún cambio o pausas en el tratamiento.



Cuando reciba su medicamento, pida a su médico que programe sus primeros tres ecocardiogramas de seguimiento. Si no acude a las citas o si las retrasa, podría provocar la interrupción de su tratamiento.

Si desea averiguar sobre su cobertura o recibir recordatorios de citas para estos ecocardiogramas requeridos, vea información útil en la página 26.



¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte. Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo

está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).




Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope)



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Precauciones adicionales sobre la toma de CAMZYOS

Su médico necesita saber las respuestas a estas importantes preguntas antes y durante el tratamiento con CAMZYOS:



¿Está tomando (o tiene planeado tomar o dejar de tomar) cualquier otro medicamento que no sea CAMZYOS?

Informe a su proveedor de atención médica acerca de los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tomar CAMZYOS con determinados medicamentos o jugo de toronja puede causar insuficiencia cardíaca

No suspenda ni cambie la dosis de un medicamento ni empiece a tomar un medicamento nuevo sin consultar con su proveedor de atención médica.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usted:

- Toma medicamentos de venta libre, incluyendo omeprazol (por ejemplo, Prilosec®), esomeprazol (por ejemplo, Nexium®) o cimetidina (por ejemplo, Tagamet®)
- Toma otros medicamentos para tratar su CMH obstructiva
- Contrae una infección



¿Tiene otras afecciones médicas? ¿Está embarazada o amamantando o tiene planeado quedar embarazada o amamantar?

CAMZYOS puede ser perjudicial para el bebé en gestación. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si queda embarazada o piensa que podría haber quedado embarazada durante el tratamiento con CAMZYOS. También puede reportar su embarazo llamando a la línea de reportes de Bristol Myers Squibb al 1-800-721-5072 o visitando www.bms.com.

Si es una mujer con capacidad de quedar embarazada:

- Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con CAMZYOS
- Usted deberá usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con CAMZYOS y durante al menos 4 meses después de su última dosis de CAMZYOS
- CAMZYOS puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Hable con su proveedor de atención médica sobre el uso de métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con CAMZYOS

Se desconoce si CAMZYOS pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con CAMZYOS.



Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes síntomas o si alguno de ellos empeora: falta de aliento, dolor en el pecho, fatiga, hinchazón en las piernas, sensación de aceleración del corazón (palpitaciones) o aumento de peso en poco tiempo.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.

CAMZYOS (mavacamten) 2.5, 5, 10, 15rr (mavacamten)

Más información en camzyos.com

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte. Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo

está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite <u>www.CAMZYOSREMS.com</u> o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo nsuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).




Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos

- o si sus síntomas empeoran, incluyendo: • falta de aliento • fatiga • hinchazón de las piernas • dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Conozca la experiencia de pacientes reales que recibieron CAMZYOS



"Sentir mejoras en mis síntomas después de tomar el medicamento me permitió volver a mis caminatas diarias. Estoy tan contenta de participar en las cosas que me gusta hacer; ahora solo espero poder volver a hacer planes activos con mi esposo y mi familia".

-Stephanie



Dani

"Poder viajar, recorrer el aeropuerto, subir al avión, llevar el equipaje... es algo que no podría haber imaginado. Así que, el hecho de saber que puedo viajar es un cambio bienvenido; sé que tengo la capacidad de ir a ver a mi familia cuando guiero. Es maravilloso".

-Dani




Los resultados individuales podrían variar.

"He estado en tratamiento con CAMZYOS desde hace ya un año, y estoy asombrado por la diferencia que ha tenido con mis síntomas. No puedo hacer todo lo que solía hacer, pero puedo estar más activo de lo que he estado últimamente".

Más pacientes que recibieron CAMZYOS:









Para escuchar más historias sobre lo que **CAMZYOS** puede hacer por los pacientes con CMH obstructiva sintomática, visite https://www.camzyos.com/patient-stories

Estos pacientes recibieron una compensación por su tiempo.

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo nsuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).




Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

¿Quiere compartir su experiencia?



Si usted está llevando adelante su condición exitosamente y está recibiendo un tratamiento con CAMZYOS®, lo que tiene para decir podría **generar un impacto positivo** en la vida de otra persona.

Descubra cómo puede "compartir para inspirar" y use su experiencia para el bien común.



Llámenos gratis al 1-855-436-5866 o visite ShareToInspire.com

Lea el apartado adjunto de Información de prescripción completa para Estados Unidos, incluyendo el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento para CAMZYOS® en el bolsillo.



© 2024 MyoKardia, Inc., una empresa de Bristol Myers Squibb. CAMZYOS® y los logotipos de CAMZYOS y MyCAMZYOS son marcas comerciales de MyoKardia, Inc. 3500-US-2400030 03/24



Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.





¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.



"Los síntomas de mi CMH obstructiva

me estaban frenando, pero ahora que mis síntomas han mejorado, he pasado de tomar pausas a asumir tareas en la granja familiar nuevamente".

ESTE ES -

MI MOMENTO **CAMZYOS**

Susan, una paciente real de CAMZYOS

Los resultados individuales podrían variar.

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:
• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • taquicardia (palpitaciones) • hinchazón de las piernas • aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Datos importantes sobre CAMZYOS

Este es un resumen de la información importante que necesita saber sobre CAMZYOS. Su proveedor de atención médica puede ayudarle a resolver cualquier duda que pueda tener acerca de este medicamento. Mantenga esta información en un lugar seguro para que pueda consultarla antes y durante su tratamiento

Preste atención a los siquientes íconos cuando lea este material:



Hable con su proveedor de atención médica



Llame a un proveedor de atención médica de inmediato



Información útil para recordar

¿Qué es CAMZYOS?

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse en actividad. Se desconoce si CAMZYOS es seguro y eficaz en niños.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo

La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Deben hacerle ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas radiológicas, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando.

Las personas que contraen una infección grave o presentan un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluvendo:

- falta de aliento fatiga hinchazón de las piernas dolor en el pecho
- taquicardia (palpitaciones) aumento de peso en poco tiempo

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

- Usted y su proveedor de atención médica deben estar ambos inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
- Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
- Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
- Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al 1-833-628-7367.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA. la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.



¿Qué debería hablar con mi proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar CAMZYOS?



Hable con su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:



Está embarazada o planea quedar embarazada; CAMZYOS podría afectar al bebé en gestación.



Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que está embarazada durante el tratamiento con CAMZYOS. También puede reportar su embarazo llamando a Bristol Myers Squibb al 1-800-721-5072 o visitando www.bms.com.

Si es una mujer con capacidad de quedar embarazada, su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de comenzar a tomar CAMZYOS. Usted deberá usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con CAMZYOS v durante al menos 4 meses después de su última dosis de CAMZYOS.



CAMZYOS puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Hable con su proveedor de atención médica sobre el uso de métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con CAMZYOS.



Está amamantando o planea amamantar

Se desconoce si CAMZYOS pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con CAMZYOS.

¿Sobre qué medicamentos debería hablar con mi proveedor de atención médica?



Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma antes y durante el tratamiento con CAMZYOS, incluyendo:

- medicamentos de venta con receta médica
- medicamentos de venta libre (OTC)
- vitaminas
 - suplementos a base de hierbas

Tomar CAMZYOS con determinados medicamentos o jugo de toronja puede causar insuficiencia cardíaca.



Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usted:

- toma medicamentos de venta libre, incluyendo omeprazol (por ejemplo, Prilosec®), esomeprazol (por ejemplo, Nexium®) o cimetidina (por ejemplo, Tagamet®)
- toma otros medicamentos para tratar su CMH obstructiva
- contrae una infección



No deje de tomar ni cambie la dosis de un medicamento ni comience a tomar un medicamento nuevo sin consultarlo con su proveedor de atención médica.



Continúa en la página siguiente

Más información en camzyos.com

Datos importantes sobre CAMZYOS (continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte.



CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo uficiencia cardíaca (una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).



Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:

- falta de aliento
- hinchazón de las piernas

- dolor en el pecho
- taquicardia
- aumento de peso en poco tiempo

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

Los efectos secundarios más comunes de CAMZYOS incluyen mareos y desmayos (síncope).



Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.



Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072.

¿Cómo debo tomar CAMZYOS?



Antes de comenzar el tratamiento con CAMZYOS, su proveedor de atención médica le hará un ecocardiograma (eco) para evaluar la CMH obstructiva. Se debe monitorear periódicamente su corazón con ecocardiogramas durante el tratamiento para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS.



Hable con su proveedor de atención médica para obtener más información sobre los ecocardiogramas y su programa de ecocardiogramas.

¿Cómo debo tomar CAMZYOS? (continuación)




CAMZYOS viene en forma de cápsulas de liberación inmediata, que contienen 2.5, 5, 10 o 15 mg de mavacamten. Cada cápsula está marcada con la palabra MAVA y la cantidad de miligramos (mg) que contiene.

Excipientes: croscarmelosa sódica, hipromelosa, estearato de magnesio (no bovino), manitol y dióxido

Cápsula: contiene óxido de hierro negro, gelatina, óxido de hierro rojo, dióxido de titanio y óxido de hierro

Tome CAMZYOS exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.



✓ Una vez al día, por vía oral X No rompa, abra, muerda ni mastique la cápsula



Trague la cápsula entera

X No cambie su dosis de CAMZYOS sin consultarlo primero con su proveedor de atención médica



Hable con su proveedor de atención médica sobre la dosis correcta para usted.

¿Qué pasa si olvido una dosis?

✓ Tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a su hora programada habitual al día siguiente.



X No tome 2 dosis el mismo día para compensar la dosis omitida

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis, suspenderle temporal o permanentemente el tratamiento con CAMZYOS si presenta determinados efectos secundarios.

¿Qué ocurre si tomo una cantidad excesiva de CAMZYOS?



Llame de inmediato a su proveedor de atención médica o acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano.

¿Cómo debo conservar CAMZYOS?

Guarde las cápsulas de CAMZYOS entre 20 °C y 25 °C (68 °F-77 °F).

Guarde CAMZYOS y todos los demás medicamentos fuera del alcance de los niños.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA, la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.





Más información en camzyos.com



MyCAMZYOS está aquí para ayudarle y responder preguntas durante su tratamiento con CAMZYOS.



Navegador MyNurse

Cuando su médico le recete CAMZYOS y se inscriba en el programa MyCAMZYOS, se le asignará un **Navegador de enfermería*** especializado que le guiará por los servicios que se mencionan a continuación.



Proporcionar información importante al comenzar el tratamiento, conocer sus necesidades específicas y **responder preguntas sobre CAMZYOS**[†]



Ayudarle a **organizar y mantenerse en el camino correcto para las citas claves** cuando inicie el tratamiento con CAMZYOS



Proporcionarle información sobre otros recursos que podrían estar disponibles para usted



Especialista de MyAccess

Cuando su médico y usted se inscriban en MyCAMZYOS, los **Especialistas de acceso para pacientes** empezarán a trabajar con su compañía de seguros para:

- Determinar su cobertura para CAMZYOS
- Ayudarle a entender cualquier gasto que usted deba pagar de su bolsillo
- Brindarle información sobre los recursos que podrían estar disponibles para usted, tales como los siguientes:



Una oferta de prueba gratuita para ayudarle a comenzar el tratamiento. Es posible que sea elegible para obtener gratis la receta de su primer mes



Recursos financieros, incluyendo:

- Programa de copagos: los pacientes con seguro comercial podrían pagar tan solo \$10 al mes
- Programa de copagos para estudios radiológicos: los pacientes con seguro comercial podrían ser elegibles para recibir ayuda con los copagos para los estudios radiológicos requeridos

Consulte los términos y condiciones de MyCAMZYOS en el bolsillo.

Si desea inscribirse por teléfono o tiene preguntas generales sobre CAMZYOS, llame al **855-CAMZYOS** (**855-226-9967**) de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (horario de la costa este). También puede inscribirse en línea en **MyCAMZYOS.com**. Pregunte a su médico acerca de cómo inscribirse en **MyCAMZYOS.**

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento, incluyendo los **recuadros de ADVERTENCIA**, la <u>Información de prescripción completa para Estados Unidos</u> y la Guía del medicamento de CAMZYOS.

*Disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (horario de la costa este). Si llama fuera de este horario, el personal de enfermería devolverá su llamada al siguiente día laborable. Los tiempos de respuesta pueden variar en Puerto Rico.

†Los navegadores de enfermería pueden ofrecer información general sobre CAMZYOS, pero no pueden dar consejos médicos. Su médico es la mejor fuente de información acerca de su salud.



